



## HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

Mattilsynet  
Miljødirektoratet  
Veterinærinstituttet  
Norsk inst. for naturforskning

### Spørsmål til cwd-møte Hardangervidda 11/10

1. Pr. i dag, hvilket mål legges til grunn mht. innførte og aktuelle tiltak det kan være aktuelt å innføre på kort sikt? Er det a) utrydde klassisk cwd eller b) begrense smitte?
2. I VKM-rapport 2019:9 og i Miljødirektoratets rapport M-791/2017 antas smittespredning av cwd i en villreinbestand i hovedsak å være frekvensavhengig, ikke tetthetsavhengig. Dette ble lagt til grunn for utskyting av hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1. Bestandsreduksjon ble vurdert å ikke være et aktuelt virkemiddel for å bekjempe cwd i bestanden. Miljødirektoratet uttaler imidlertid følgende; «Uansett om strategien blir å holde smittepresset nede, eller å forsøke å utrydde sykdommen, så vil en bestandsreduksjon være riktig.» Hvordan samsvarer dette med konklusjonen i nevnte rapporter som er følgende; “Det meste tyder på at skrantesyke ligger nærmest en frekvensavhengig smitteoverføringsmodell. Dette betyr at hvis vi reduserer en hjortedyrbestand til det halve, vil skrantesyke-smitten likevel spre seg med omtrent samme hastighet”.
3. Eventuelt uttak av dyr i vinter:
  - a. Hva er målet?
  - b. Hva er antatt effekt mht. smittebekjempelse, begrense smittespredning og oppnådd økt kunnskap?
  - c. Hvilken strategi er dette tiltaket en del av?
  - d. Hva tilsier at dette må gjøres i vinter og ikke eventuelt kan utsettes til vinteren 2022?
4. Nordfjella sone 2 – vil bestanden betraktes som cwd-smittet i det videre arbeidet eller vil det betraktes som en bestand uten cwd? Dette har bl.a. betydning for strakstiltak, soneforskrift, tiltak mht å hindre utveksling av dyr mellom områdene ol.
5. Setesdal-Ryfylke: er det planlagt tiltak for å hindre utveksling av villrein mellom SR og HV?
6. Er det vurdert ekstraordinært uttak (utenom jakt) av annet hjortevilt på Hardangervidda og Nordfjella?
7. Tom Hemming Karlsen og Egil Reimers har i et distribuert notat presentert følgende følgende teori mht. cwd hos norsk villrein: «cwd hos rein er noe som har hatt lav forekomst og som har svingt opp og ned til alle tider.» Finnes det noen objektive holdepunkter for en slik teori? Hva tilsier eventuelt at dette ikke er en reell mulighet?

Rødberg, 09.11.2020  
Svein Erik Lund